

نکات ایمنی

۱- در بیمارستان

- در صورت لزوم حداقل فاصله ۲ متر را رعایت کنید و نا آنجا که ممکن است، زمان ملاقات را به کمترین مقدار ممکن تقلیل دهید.
- محل خواب خود را از دیگران جدا کنید.
- ناآنجا که ممکن است آب و میغات به میزان فراوان استفاده کنید.
- در سرو غذا از ظروف ما قابلیت شستشوی آسان استفاده کنید و غذای مصرف خود را با دیگران تقسیم نکنید.
- برای رعایت ایمنی پیشتر در ارتباط با اعضا خانواده، حداقل فاصله نیم متر را برای مدت ۲ ماه رعایت کنید.
- به طور روزانه استحمام نمایید و بعد از استحمام حمام را با آب فراوان شستشو دهید. در صورت امکان به تنباخت استحمام کنید.
- لباس‌ها، ملحفه، پوشش و لوازم شخصی را مجزا از سایر لباس‌ها بشویید.
- هشتمان دفع ادرار و مدفوع از پاشیدن آن به اطراف جلوگیری کرده و پس از آن ۲ بار فلاش تانک را تخلیه کنید.

۲- در سفر و رفت و آمد

پس از ترخیص از بیمارستان، از وسیله تقلیله اختصاصی حیث رفتن به منزل استفاده کنید. حتی الامکان از وسائل حمل و نقل عمومی استفاده کنید و در صورت ضرورت، زمان استفاده را به یک ساعت در روز برای مدت یک هفته محدود نمایید.

۳- در منزل

- از تماش طولانی مدت با اعضا خانواده و دیگران در امور روزمره خودداری کنید و در سه روز اول پس از ترخیص از بیمارستان موادر ذیل را رعایت نمایید:
- نایک ساعت بعد از تجویز و استفاده رادیودارو از خوردن و آشامیدن پرهیز کنید. در صورت بروز تبعو و استفراغ ناء ساعت بعد از مصرف رادیودارو، مواد دفع شده را در یک ظرف پکبار مصرف و قابل دوربینی، جمع آوری و محظوظات آن را با آب فراوان در محفظه توالت دوربینی کنید.
- از اتفاق درمان مکرر در موقع لزوم و با اجازه و آگاهی پرسنلاران بخش خارج نشوید.
- از دستمال کاغذی بجای دستمال پارچه‌ای استفاده کنید.
- از ملاقات و مجاورت با کودکان و زنان حامله پرهیز کنید.
- هر گونه ملاقات با افراد رایه یک روز پس از تجویز رادیودارو با رعایت حداقل فاصله ۲ متر و زمان کمتر از ۳۰ دقیقه موکول نمایید.
- هر روز حمام کنید. موهایتان را با شامبو بشویید و نظافت شخصی را رعایت نمایید.
- در هنگام دفع ادرار و مدفوع از پاشیدن آن به اطراف جلوگیری کرده، پس از آن ۲ بار فلاش تانک را تخلیه کنید.
- دست‌هایتان را با آب زیاد و صابون شستشو دهید.

۴- در منزل

از تماش طولانی مدت با اعضا خانواده و دیگران در امور روزمره خودداری کنید و در سه روز اول پس از ترخیص از بیمارستان موادر ذیل را رعایت نمایید:

توصیه‌های حفاظتی به بیماران تحت درمان با رادیوداروی ید-۱۳۱



از آنجایی که فرآیند درمان با ماده پرتوزای ید-۱۳۱ انجام گرفته است، شما به عنوان یک منبع تابش پرتوهای پونسانز برای دیگران به شمارم روید.

علیرغم وجود مزایای تشخیصی و درمانی ماده مذکور برای بیمار، تابش ناشی از این ماده برای اطرافیان می‌تواند زیانبار باشد. لازم به ذکر است که پس از تجویز این ماده و انجام فرآیند درمانی، هنوز مقداری از ماده پرتوزا در بدن شما وجود دارد که می‌تواند از طریق بزاق دهان، تعزیریق و ادرار دفع کردد. لذا جهت حفظ سلامت خود و دیگران و محیط زیست، ضروری است تا پایان زمان درمان و مدتی پس از آن نکات ایمنی ذیل را رعایت کنید.

نکات ایمنی

۷- شرایط اضطراری

در صورت بروز هر گونه سانجه نظیر سانجه رانندگی و با شرایط اضطراری پزشکی دیگر، باید تیم امداد پزشکی از نوع و میزان رادیوداروی درمانی و تاریخ استفاده‌آن مطلع گردد و در صورت اضطرار با پزشک مربوطه تماس حاصل گردد.



سازمان انرژی اتمی ایران
مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور
امور حفاظت در برابر اشعه
www.aeo.org.ir/inra
۸۸ فروردین

۶- فعالیت‌های اجتماعی

- حتی الامکان تا یک هفته پس از ترخیص، از فعالیت‌های اجتماعی مشروطه ذیل که مستلزم تماش طولانی مدت با دیگران است، پرهیز کنید:
- رفتن به مکان‌های عمومی پرجمعیت نظیر سینما، سالن‌های ورزش و ...
- رفتن به محل کار
- رفتن به مراکز خرید پرجمعیت
- شرکت در مهمانی‌ها
- رفتن به حمام های عمومی
- در صورتی که مسئولیت تهیه غذا و هر گونه مواد خوارکی دیگر و همچنین تهدیداری از کودکان و زنان حامله را به عهده دارید، اگردا توصیه می‌گردد نا ۳ هفته از فعالیت‌های فوق اجتناب کنید.



۵- کودکان، بچه‌ها و زنان حامله

در هفته اول بعد از ترخیص، مراقبت از کودکان خردسال را به عهده دیگران و اکثار کنید و در غیر این صورت از تماش نزدیک با آن‌ها (نظیر خوابیدن کنار کودک) خودداری نمایید و از ملاقات طولانی مدت با پچه‌ها و زنان حامله داده باشید. حدود چند هفته از بوسیدن فرزندان پرهیز کنید، جرا که باعث پرتوگیری بیهوذه کودک می‌گردد.

۶- حاملک و شیر دانش به کودکان

حاملک‌های در بینین بارداری، پس از درمان با رادیوداروی ید-۱۳۱ از باردار شدن به مدت ۶ ماه اکيدا خودداری و با پزشک خود در خصوص احتمال درمان مجدد با رادیودارو در ماههای آینده مشورت نمایید.

در صورت احتمال حاملکی و یا عدم اطلاع از حاملک در زمان مصرف رادیودارو، لفاظله در خصوص این موضوع با پزشک معالج مشورت گردد.



به محض شروع درمان با رادیودارو، شیردادن به کودک را متوقف نموده و درین خصوص با پزشک معالج مشورت گردد.

